

SIS | Soluciones Integrales Stoller para Cultivo de Cítricos

	Maduración de Brote e Inducción Floral	Inducción y Diferenciación Floral	Brotamiento de Yemas	Floración y Polinización	Cuajado de Frutos	Crecimiento del Fruto	Maduración y Cosecha
Etapa Fenológica							
Beneficio	Asegurar la translocación de reservas en la post cosechas para una inducción floral vigorosa. Eliminar el estrés de la cosecha.	Favorecer la diferenciación y formación de yemas reproductivas en forma vigorosa y uniforme.	Asegurar el desarrollo y emergencia uniforme de las yemas florales. Asegurar la visibilidad del polen y del óvulo de la flor.	Lograr la fecundación efectiva del óvulo en la polinización, asegurando el cuajado de los frutos.	Reducir la caída de frutos y asegurar la retención de la carga. Prevenir los desórdenes fisiológicos y asegurar la calidad de la fruta.	Uniformizar el calibre e incrementar la calidad de los frutos a cosechar reduciendo los desórdenes fisiológicos de los frutos.	Incrementar los azúcares (*Brix) y regular la acidez de los frutos. Asegurar las reservas para la siguiente campaña.
Fisiológico	Bio-FORGE 1.5 L/Ha	NBX 4 a 6 L/Ha/Aplicación X-CYTE 2 L/Ha/Aplicación FOLI-ZYME GA 5 a 10 L/Ha/Aplicación	STIMULATE 1 a 2 L/Ha/Aplicación	SETT FIX 4 a 8 L/Ha/Aplicación	Bio-HOLD 1L/Ha/Aplicación	N-LARGE 0.2 a 0.4L /Ha/Aplicación X-CYTE 2 L/Ha/Aplicación	Sugar MOVER 4 a 6 L/Ha/Aplicación NITRATE BALANCER 4 a 6 L/Ha/Aplicación
Nutricional	MASTERMINS 8-31-4 4 a 6 L/Ha/Aplicación SUPER K 4 a 6 Kg/Ha/Aplicación	ReZist 1 a 1.5L/Ha cada uso por 4 a 5 aplicaciones	QUELATOS THIS ZINC 3Kg/Ha cada uso QUELATOS THIS HIERRO 3Kg/Ha cada uso QUELATOS THIS MANGANESO 3Kg/Ha cada uso			SUPER K 8 a 10 Kg/Ha/Aplicación QUELATOS THIS MAGNESIO 2 a 4 Kg/Ha/Aplicación	MASTERMINS 0-4-18 8 a 10 L/Ha/Aplicación KEYLATE MOLIBDENO 1 a 2 L/Ha/Aplicación
Terapia radicular	ROOT FEED 10 Kg/Ha , 4 aplicaciones al suelo cada 15 días					ROOT FEED 10 Kg/Ha, 2 a 4 aplicaciones al suelo cada 15 días	
Defensivo		Golden Natur'I Oil 1.5 L/200 L agua/Aplicación PHYTOGARD ZINC 4 L/Ha/Aplicación		TOP COP 1.5 a 2 L/Ha/Aplicación		Golden Natur'I Oil 1.5 L/200 L agua/Aplicación	